

小児常用薬剤用量チェック表

抗生物質・抗ウイルス剤

★年齢ごとの体重を上段の設定値とした場合の、各薬剤の添付文書における用量の上限(単位:DS, 細粒剤はg,シロップ剤はmL,坐剤,テープはmg)を示しました。最新の添付文書を確認してください。

★製剤量と成分量の記載あり,注意!

平成16年6月30日現在

★1日投与量と1回投与量の記載あり,注意!

医薬品名	規格	1日投与量	最大用量	回数	年齢 体重(kg)	製剤量(1日量)															
						1M	3M	6M	1歳	18M	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳
エリスロシンDSW 20%	200 mg/g	25-50 mg/kg	1200 mg/day	4-6 回	4	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
クラリスDS小児用	100 mg/g	10-15 mg/kg	400 mg/day	2-3 回	4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.0	4.0	4.0
ケフラール細粒小児用100mg	100 mg/g	20-40 mg/kg		3 回	4	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.4	11.6	12.8	15.2
ジスロマック細粒小児用	100 mg/g	10 mg/kg	500 mg/day	1 回	4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8
シンクルDS200	200 mg/g	25-50 mg/kg	50-100 mg/kg/day	6 hr毎	4	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.5	7.3	8.0	9.5
セフゾン細粒小児用10%	100 mg/g	9-18 mg/kg		3 回	4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	3.4	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.8	6.8
トミロン細粒小児用10%	100 mg/g	9-18 mg/kg		3 回	4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	3.1	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.8	6.8
パセトシン細粒	100 mg/g	20-40 mg/kg		3-4 回	4	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.4	11.6	12.8	15.2
ホスミンDS400	400 mg/g	40-120 mg/kg		3-4 回	4	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4
ミオカマイシンDS200	200 mg/g	20-40 mg/kg		3-4 回	4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6
ミノマイシン顆粒	20 mg/g	2-4 mg/kg		1-2 回	4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6
リカマイシンDS200	200 mg/g	20-30 mg/kg		3 回	4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.4	4.8	5.7
ワイドシリン細粒200	200 mg/g	20-40 mg/kg		3-4 回	4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6

★他の薬剤が使用できないか,無効の場合にのみ適用を考慮すること(小児等への投与参照)

医薬品名	規格	1回投与量	最大用量	回数	製剤量(1回量)															
					0.10	0.15	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	0.43	0.48	0.53	0.60	0.65	0.73	0.80	0.95
アストリックDS80%	800 mg/g	20 mg/kg/回	800mg/回	4 回	★水痘の場合															
ゾビラックス顆粒40%	400 mg/g	20 mg/kg/回	800mg/回	4 回	★水痘の場合															
タミフルDS3%	30 mg/g	2mg/kg/回	75mg/回	2 回				0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.5
パナンDS	50 mg/g	3mg/kg/回	4.5mg/kg/回	2-3 回	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3
フロモックス小児用細粒100mg	100 mg/g	3mg/kg/回		3 回	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14
ファロムDS小児用	100 mg/g	5mg/kg/回	10mg/kg/回,300mg/回	3 回	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9
メイアクトMS小児用細粒	100 mg/g	3mg/kg/回	200mg/回	3 回	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14

小児常用薬剤用量チェック表

解熱剤1回量

医薬品名	規格	1回投与量	最大用量	回数	年齢 体重(kg)	製剤量(1回量)															
						1M	3M	6M	1歳	18M	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳
カロナールSyr2%	20 mg/mL	10 mg/kg	15 mg/kg/回	2 回まで	4	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.0	13.0	14.5	2.0	2.0
カロナール細粒 20%	200 mg/g	10 mg/kg		2 回まで	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.6	0.7	0.8	0.85	0.95	1.05	1.2	1.3	1.45	1.6	1.9
ポンタールシロップ	32.5 mg/mL	6.5 mg/kg		2 回まで	4	0.8	1.2	1.6	2	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6
ポンタール散	500 mg/g	6.5 mg/kg		2 回まで	4	0.05	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.18	0.21	0.22	0.25	0.27	0.31	0.34	0.38	0.42	0.49
						★ポンタール散の小児用量は,シロップの小児用量をもとに換算															
医薬品名	規格	1回投与量	最大用量	回数	成分量(1回量)																
アンヒバ坐剤小児用			乳児 6 mg/kg/回			50 mg			50 mg-100 mg			100 mg			100 mg-200 mg						
ユニブロン坐剤		3-6 mg/kg		2 回まで	4	24mg	36mg	48mg	60mg	66mg	72mg	84mg	96mg	102mg	114mg	126mg	144mg	156mg	174mg	192mg	228mg